

Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI

☎ 071 33 77 11
✉ info@aviq.be

Annexe : Formulaire livraison en officine et SOP du vaccin COVID-19

Objet : Campagne de vaccination automne/hiver 2026-2027.

Chère consœur, cher confrère,

L'automne approche, entraînant avec lui une recrudescence attendue des infections respiratoires saisonnières. Avec la baisse des températures, la fréquentation des cabinets par des patients vulnérables augmente, rendant d'autant plus essentielle une stratégie de prévention vaccinale adaptée. Quatre pathologies méritent une attention particulière durant cette période : la **grippe**, le **COVID-19**, le **pneumocoque** et le **virus respiratoire syncytial (VRS)**. Aborder ces thématiques en consultation, y penser systématiquement, c'est parfois éviter une hospitalisation.

Vous trouverez ci-joint les **recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)**, ainsi que les informations pratiques relatives à la campagne de vaccination 2026-2027.

COVID-19

Le vaccin proposé contre le COVID-19 à partir de 12 ans est un vaccin ARNm Comirnaty (Pfizer BioNTech) adapté au sous-variant XFG. Ce vaccin est RTU (ready to use) et ne doit donc pas être dilué avant injection. Il reste gratuit cette année et sera disponible à partir du lundi 14 septembre 2026 en prenant contact avec une pharmacie wallonne pour commander vaccins et matériel nécessaire.

Pour ce faire, trois possibilités sont offertes :

1. La délivrance de flacons (comptant 6 doses chacun, ou 7 doses via l'utilisation des seringues zero dead volume fournies) valables 12 heures à partir de la sortie du frigo de la pharmacie.
2. La préparation de seringues préremplies par le pharmacien, prêtes à l'emploi, valables 6 heures à partir du percement du flacon servant à la préparation dans la pharmacie.
3. Si vous disposez d'un frigo médical ET d'une sonde de mesure de température agréée, les flacons seront valables 10 semaines à partir de leur date de décongélation s'ils sont conservés à une température contrôlée comprise entre 2 et 8°C. Il faut que la sonde accompagne le vaccin lors de son transport entre la pharmacie et votre frigo. A noter que même dans ce cas, dès que le flacon est percé, la validité repasse à 6 heures, pour raison de perte de stérilité.

Une commande groupée pour une institution doit se faire via les pharmacies sur le formulaire en annexe reprenant :

- Le nom, le prénom et le numéro NISS de chaque patient.
- Le cachet du médecin reprenant ses coordonnées ainsi que son numéro INAMI.

Cette vaccination est recommandée annuellement, en septembre/octobre. Dans le cas d'une administration conjointe avec le vaccin contre la grippe, le mois d'octobre sera le plus adéquat.

L'avis 2026 du CSS concernant la vaccination contre le COVID-19 n'a pas encore été publié. Dès qu'il sera disponible, son résumé sera mis à jour dans le [Guide de la vaccination de l'adulte](#). Les groupes cibles y seront détaillés mais devraient s'apparenter à ceux de l'année dernière, prioritairement :

- toute personne dès 65 ans
- les personnes séjournant en institution
- les professionnels de santé
- les personnes fragiles/immunodéprimées

Grippe

Cette vaccination annuelle est recommandée de la mi-octobre à fin novembre. Dans le cas d'une administration conjointe avec le vaccin contre le COVID-19, le mois d'octobre sera le plus adéquat.

Voici un tableau simplifié associant les vaccins recommandés et les groupes cibles selon leur niveau de priorité :

Très haute priorité
Haute priorité
 Priorité modérée

≥ 75 ans		Préférer vaccin adjuvanté ou vaccin haute dose ¹
Personnes séjournant en institution		
65-74 ans		
Personnes immunodéprimées		Envisager vaccin adjuvanté
Atteintes chroniques : poumon, cœur, foie, neuro, métabolique		
Atteinte rénale chronique		50-64 ans : envisager vaccin haute dose ≥ 65 ans : préférer vaccin haute dose
Femme enceinte quel que soit le stade de la grossesse		Vaccin à dose standard
Enfants sous aspirine		
IMC ≥ 40		
Travailleur	Secteur des soins au sens large	
	Contact professionnel avec volailles/porcs	
50-64 ans en bonne santé		
Vaccination cocoon : enfants et personnes vivant dans le même foyer qu'une personne à haut risque (par exemple un enfant de moins de 6 mois)		

¹ Les deux vaccins ont démontré une supériorité clinique par rapport aux vaccins à dose standard mais la qualité des données est meilleure pour le vaccin à haute dose.

Les vaccins disponibles en Belgique sont des vaccins inactivés trivalents.

Si les vaccins adjuvanté et à haute dose ne sont pas disponibles, **ne reportez pas la vaccination : les vaccins standards restent efficaces.**

Vaccins disponibles	Âge selon la notice	Remboursement INAMI
Vaccins à dose standard (15 µg par souche) sans adjuvant	≥ 6 mois	Pour toute personne appartenant aux groupes cibles (TPA)
Vaccin adjuvanté	≥ 50 ans	Pour toute personne ≥ 65 ans (TPA)
Vaccin à haute dose (60 µg par souche)	≥ 60 ans	Pour toute personne ≥ 65 ans (TPA)

Pneumocoque

Cette vaccination est recommandée : - à **toute personne en bonne santé dès 65 ans.**
- aux adultes de 18 à 64 ans avec facteur(s) de risque

Elle consiste en une dose unique, sans rappel.

Âge	Vaccin recommandé	Remboursement INAMI
18-49 ans	PCV20	/
50-84 ans	PCV20 / PCV21	Remboursement TPA uniquement pour certains groupes à risque : PCV20 entre 65 et 80 ans PCV21 à partir de 65 ans
≥ 85 ans	PCV20 / PCV21 (préférer le PCV21)	PCV21 : remboursement TPA uniquement pour certains groupes à risque

VRS

Cette vaccination en une dose est recommandée en septembre/octobre :

- A toute personne de **plus de 75 ans**
- Aux personnes à risque de **plus de 60 ans présentant au moins un facteur de risque**
- Aux personnes immunodéprimées
- Aux personnes vivant en **institution**

La nécessité d'une dose de rappel n'a pas été établie à ce jour.

Un remboursement est prévu via un [formulaire INAMI](#) pour les **femmes enceintes** dont l'accouchement est prévu entre début septembre et fin mars. Cette vaccination est recommandée entre la 28^{ème} et la 36^{ème} semaine de grossesse et permet la protection passive du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. La vaccination de la femme enceinte contre la grippe peut être programmée en même temps, mais un délai d'au moins 14 jours sera respecté après la vaccination contre la coqueluche.

Un second vaccin a obtenu un remboursement via un [formulaire INAMI](#) pour les **personnes à partir de 65 ans** vivant en institution ou présentant certains facteurs de risque.

Liens et informations pratiques

Plus de précisions au sujet des groupes cibles et des schémas de vaccination, ainsi que les liens vers les avis complets du Conseil Supérieur de la Santé dans le **Guide de la vaccination de l'adulte** : <https://www.aviq.be/fr/prevention-maladies/vaccination>

Nous insistons sur l'**enregistrement numérique** de TOUTES les vaccinations, afin qu'elles soient intégrées dans le Réseau Santé Wallon. Pour les médecins, l'encodage se fait via les logiciels médicaux ou en ligne www.reseausantewallon.be. Pour les pharmaciens, l'encodage se fait via les e-Forms.

Vous trouverez des informations et supports de communication sur :
<https://www.aviq.be/fr/abcdaire-des-maladies-infectieuses> (par pathologie infectieuse)
<https://www.aviq.be/fr/tousse-dans-ton-bras>

Nous restons disponibles pour toute question au sujet de la vaccination de l'adulte via l'adresse électronique : vaccination@aviq.be

Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse collaboration.

Direction Surveillance des Maladies Infectieuses
Agence pour une Vie de Qualité
Département Santé
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Tél. : +32 (0)71 33 77 77
surveillance.sante@aviq.be